

Instruktion

Fastställt av: Magnus Hedström

Upprättat av: Sara Norberg

Granskare: Bo Sundqvist

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Privat primärvård, Läkemedelscentrum Västerbotten

Generella behandlingsanvisningar 2024**Generella behandlingsanvisningar (GBA) för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län****Förändringar från föregående utgåva**

Förtydligande infört angående tillägg av nya administratörer i beställningssystemet Care.

Tillägg av information angående indragningar av GBA-läkemedel under ny rubrik.

Bricanyl inj 0,5mg/ml borttaget från "Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd" då tillägg covid-19 tas bort.

Morfin inj 10mg/ml 10x10 ml borttaget från "Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd", då produkten avregistrerats och lämpligt alternativ saknas.

Morfin-Skopolamin inj 10 mg/ml + 0,4 mg/ml 10 x 1 ml borttaget från "Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd", då produkten avregistrerats och lämpligt alternativ saknas.

Tillägg Ondansetron, inj 2mg/ml till "Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd"

Byte Morfin, tabl 10mg till tabl 5mg i "Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd"

Undertecknat av

Datum	Namnteckning
Namnförtydligande	
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska	
Kommun	

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Allmänt om generella behandlingsanvisningar

Enhetliga generella behandlingsanvisningar för Västerbottens län ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan Region Västerbottens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Ett GBA-förråd definieras som ett lager av särskilt fastställda läkemedel som finns beläget i kommunen och kan användas av den kommunala hälso- och sjukvården till personer inskrivna i särskilt boende och i hemsjukvård utifrån dessa fastställda anvisningar. Generella direktiv definieras i HSLF FS 2017:37 6 kap § 6–7 och endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven skall anges indikationerna och kontraindikationerna samt doseringen och antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning samt kontrollerat läkemedlets indikation och kontraindikationer. Denna behovsbedömning dokumenteras i patientjournal. Ordinationer enligt generella direktiv skall utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet.

Generella behandlingsanvisningar för Västerbotten består av tre delar:

Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna på boende och inskrivna i hemsjukvård enligt generella direktiv (sid 6-10)

Patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård (t ex vid enstaka hembesök) omfattas inte av dessa generella direktiv.

Läkemedel som kan ges efter individuell bedömning av sjuksköterska vid enkla åkommor till vuxna på boende och inskrivna i hemsjukvård enligt generella direktiv (sid 11)

Patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård (t ex vid enstaka hembesök) omfattas inte av dessa generella direktiv.

Läkemedel som SKA finnas i GBA-förråd (sid 12) samt Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd (sid 13-14)

GBA-förråd i kommunen ska innehålla de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienter kan behöva i akuta situationer efter ordination från läkare. Genom att ett visst läkemedelssortiment finns tillgängligt i kommunernas GBA-förråd underlättas ordination och administrering på jourtid och möjliggör att det går snabbt att komma igång med angelägen läkemedelsbehandling till vuxna som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i ordinärt boende och på särskilt boende. Läkemedel som ordineras akut av läkare med dosering antingen stående eller vid behov kan lämnas ut från GBA-förrådet till patienten och/eller administreras i avvaktan på receptexpediering eller ordinarie leverans från dosapotek.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

De läkemedel som SKA finns i GBA-förråd är till exempel läkemedel som kan ges i akuta situationer samt läkemedel för palliativ vård. Läkemedel som KAN finns i GBA-förråd är läkemedel som det kan finnas behov av.

- ❖ = narkotikaklass II
- ❖ = narkotikaklass IV-V

Narkotikajournal ska föras för samtliga narkotikaklassade preparat enligt lokal rutin.

Läkemedel i GBA-förråden ska särskiljas från patientbundna läkemedel. Läkemedel som receptexpedierats eller dosdispenserats till enskild patient får inte införas till GBA-förråd.

Viktigt om läkemedel vid palliativ vård

Läkemedel som används vid vård i livets slutskede (palliativ vård), dvs till svårt sjuka/döende patienter med kort förväntad överlevnad, dagar – enstaka veckor, som ej längre kan ta tabletter, tas från GBA-förrådet. GBA-förrådet fylls sedan på genom beställning enligt nedan. Ordinationerna för läkemedlen journalförs av läkare samt sjuksköterska i patientjournalen. Läkaren registrerar recept i läkemedelsmodulen alternativt om patienten har dosdispenserade läkemedel skrivs recept i Pascal med kommentaren "tas ur GBA-förråd" till vårdgivare och apotek. Läs mer om vilka läkemedel som rekommenderas vid palliativ vård i Terapirekommendationer 2024.

Viktigt om antibiotikakurer från GBA-förråd

Enbart antibiotikakurer **som behöver påbörjas under kvällar och helgdagar** (jourtid) ska tas från GBA-förrådet. Läkemedlet ordinerar och journalförs på samma sätt som palliativa läkemedel (se ovan). Hela antibiotikakuren tas vid dessa tillfällen från GBA-förrådet som sedan fylls på genom ny beställning enligt nedan. För antibiotikakurer som påbörjas under ordinarie arbetstid görs en individuell förskrivning till den aktuella patienten och läkemedlet hämtas ut på apotek.

Beställning och hantering av läkemedel till GBA-förråd

Beställning av läkemedel till förrådet enligt Generella behandlingsanvisningar ska bara ske av läkemedel som finns upptagna i SKA- och KAN-listan. ApoEx och Region Västerbotten kommer enbart att godkänna respektive bekosta läkemedel som finns upptagna i dessa listor. Om patienten har behov av andra läkemedel än de som finns upptagna i anvisningarna, görs en individuell förskrivning för den patienten. Av patientsäkerhetsskäl ska patientens huvudsakliga läkemedelsbehandling registreras i elektronisk läkemedelslista.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Nytt förråd/Borttag av förråd/Ändring

Om ett förråd skapas som nytt, behöver tas bort eller behöver ändra t ex. leveransadress, använd blankett i bilaga 1. Kommunens MAS fyller i och mejlar det till

lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se. Läkemedelscentrum återkopplar när det är klart.

Beställningssystem för GBA-läkemedel

Behöriga beställare läggs till via det elektroniska systemet Care av respektive kommuns Care-administratörer. Även tillägg av ny Care-administratörer görs i system av nuvarande Care-administratör. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter direkt till respektive GBA-förråd är uppdaterade i Care så att ApoEx vid behov kan ta kontakt. För support eller problem med beställningssystemet Care kontaktas ApoEx.

För nödrutin med fax eller andra problem kontaktas Läkemedelscentrum:

lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se.

Beställning

Behöriga beställare beställer aktuella GBA-läkemedel via det elektroniska systemet Care.

Adress: <https://care.apoex.se>

För support med inloggning eller problem med beställningar kontaktas ApoEx.

E-post: order.norrland@apoex.se

Telefon: 010-41 04 990

Stoptid för beställning är 11.30 (=dag ett) vardagar. Leverans dag tre före klockan 15:00.

Faxbeställning finns som nödrutin om beställning via Care inte är möjligt på grund av längre datastopp. Beställning görs då på aktuellt beställningsunderlag för GBA-läkemedel via fax till ApoEx. Det går också bra att skanna faxet och mejla till ApoEx. Beställarens namn kommer att stå på ordern. Det är därför viktigt att namnet skrivs tydligt på faxblanketten.

Fax: 08-512 55 759

Leverans

Leverans direkt till GBA-förråd sker med, av ApoEx, upphandlad transportör. ApoEx ansvarar för transportererna. Mottagaren kvitterar leveransen (det finns inget krav på en specifik profession som mottagare) på aktuell leveransadress och ansvarar sedan för att leveransen hanteras enligt kommunens egna rutiner. Om en avvikelse uppstår, exempelvis försening, avsaknad av kvittens med mera kontakta ApoEx kundservice:

Telefon: 010-410 49 90

Fax: 08-512 55 759

E-post: order.norrland@apoex.se

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Indragning av läkemedel

Med en indragning av ett läkemedel menas att en eller flera satser av ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Vanligtvis sker det på företagets egen begäran men alla beslut om indragningar, oavsett nivå, sker i samråd med Läkemedelsverket. Läkemedelsmyndigheterna inom EU informerar varandra om indragningar och använder då en klassindelning av indragningarnas allvarlighetsgrad där klass I anger att indragningen är allvarlig och omedelbart skall åtgärdas. Vid en situation där läkemedelsföretag behöver utföra en indragning enligt klass I av läkemedel som finns upptaget i Generella behandlingsanvisningar för Västerbotten är det viktigt att ApoEx kan komma i kontakt med respektive kommuns MAS samt personer som ansvarar för GBA-förråd för att delge detta. Det är därför viktigt att det i beställningssystemet Care finns aktuella kontaktuppgifter direkt till person som ansvarar över GBA-förråd.

ApoEx publicerar även indragningsskrivelser på sin hemsida:

<https://sites.google.com/apoex.se/norrland/indragningar/aktuell-indragning>

Förvaring och kassation av läkemedel från GBA-förråd

Läkemedel från GBA-förråd ska särskiljas från personbundna läkemedel och förvaras enligt kommunens lokala rutin samt kasseras via närmaste Hälsocentral. Kommunerna ansvarar för att lämplig behållare för läkemedelsavfall införskaffas (med fördel en riskavfallsbehållare) och att tydlig märkning finns att detta enbart gäller läkemedel från GBA-förråden. Fasta och flytande narkotiska preparat ska avlägsnas ur sin förpackning (blister, burk, spruta) och därefter tömmas ut i behållaren. Kassation av narkotika noteras och dubbelsigneras i förbrukningsjournal enligt lokal rutin. Behållaren med kasserade läkemedel från GBA-förråd förvaras enligt kommunens rutiner för förvaring av läkemedel. Vid lämpligt tillfälle transporteras behållaren med kasserade läkemedel från GBA-förråd till närmsta Hälsocentral och hanteras enligt rutinen för Avfall-läkemedelsavfall enligt Miljöledningssystem Region Västerbotten.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enligt generella direktiv
I första hand kontaktas läkare direkt, men om tillståndet är så akut att läkare inte hinner kontaktas/kontakt ej nås, så kan läkemedel ges enligt nedanstående generella direktiv.
Om läkemedel getts akut enligt generella direktiv utan att läkare hunnit kontaktats skall jourläkare snarast i efterhand kontaktas för information och ställningstagande till vidare åtgärder.

Kontraindikationer i tabellerna gäller kontraindikationer utöver överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

ÖVERKÄNSLINGHETSREAKTION

Lindring/måttlig reaktion

Ex. lokal svullnad, klåda och/eller nässelutslag

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Ge Loratadin	Loratadin (tablett 10 mg)	2 tabletter	
2. Övervakning under minst 30 minuter			

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

ÖVERKÄNSLINGHETSREAKTION

Vid tecken på allvarlig systemisk reaktion

Obehagskänsla och inre oro, blekhet, kallsvett, buksmärta, kräkning, diarré, astma och ofta föregånget av symtom såsom urtikaria, angio-(Quincke-) ödem.

OBS! Viktigt att behandla tidigt – hellre överbehandla i onödan än för sent insatt terapi!

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Tillkalla ambulans! Lämna inte den sjuke ensam.			Vid anafylaxi bör pat. observeras på sjukhus om ej annat beslutats.
2. Ge Adrenalin intramuskulärt	Adrenalin (inj. vätska 1 mg/ml)	Dos: 0,3 – 0,5 mg (dvs 0,3–0,5 ml) ges intramuskulärt. Personer <30kg: 0,3mg, Personer >50kg: 0,5mg och däremellan justering med 0,01 mg per kg kroppsvikt	Effekt inom 5 min. Upprepa intramuskulärt vb var 10:e minut.
3. Sätt venös infartskanyl. Placera patienten liggande med höjd fotända. Vid andningsbesvär/kräkning – sittande med höjd fotända. Undvik hastig uppresning			
4. Följ patientens pulsfrekvens och blodtryck. Vid allmänpåverkan och/eller blodtrycksfall, ge Ringer-Acetat	Ringer-Acetat (inf. vätska)	500 ml ges så snabbt som möjligt (t ex pressa med händerna på droppåsen). Om patienten fortfarande är hypoton och påverkad kan ytterligare vätska ges.	Snabb effekt vid tillräcklig volym. Upprepa vb.
5. Ge Loratadin	Loratadin (tablett 10 mg)	2 tabletter om det inte tidigare givits.	Effekt inom 30–60 min
6. Ge Betapred	Betapred (inj. vätska 4 mg/ml) eller Betapred (tabl 0,5 mg)	2 ml intravenöst alternativt intramuskulärt 10 tabl upplösta i en liten mängd vatten.	Effekt först efter 2-3 tim.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

AKUT HJÄRTSVIKT/LUNGÖDEM

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Placera patienten i halvsittande kroppsläge med sänkt fotända om möjligt. Om syrgas finns inleds behandling.	Syrgas	5-10 L/min på mask alt 4 L/min på gramma	Försiktighet med höga flöden vid känd KOL och saturation >90%.
2. Ge Nitrolingual spray. Sätt venös infartskanyl.	Nitrolingual (spraylösning 0,4 mg/dos)	1-2 puffar under tungan om systoliskt blodtryck över 100 mm Hg. Kan upprepas efter 5 minuter om systoliskt blodtryck över 100 mm Hg.	Systoliskt blodtryck under 100 mm Hg.
3. Ge Furix injektion	Furix (inj. vätska 10 mg/ml)	4 ml intravenöst. Om svårigheter föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt	
4. Ge Morfin injektion	Morfin (inj. vätska 10 mg/ml)	0,25-0,5 ml ges intramuskulärt eller subkutant. Samma dos kan också ges långsamt intravenöst.	Vid kontakt med läkare, påtala om patienten står på kontinuerlig opioid-behandling sedan tidigare.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

HYPOGLYKEMI

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Kontrollera blodsocker. Om låg ge 2 dl söt dryck eller 2-4 st druvsockertabletter, upprepa vid behov efter 10 minuter och efter 15 minuter ges en smörgås. Tänk på att extra sockerkontroller måste genomföras under närmaste dygnet även om sockret normaliseras efter åtgärderna.			
<i>Om inte patienten kan äta eller dricka:</i>			
2. Ge Glukos	Glukos (inj. vätska 300 mg/ml).	30-50 ml intravenöst. Detta upprepas till B-glukos ligger över 5 mmol/L.	
3. Om svårigheter föreligger att få fri venväg ges Glucagon	Glucagon (inj. vätska 1 mg)	1 mg subkutant eller intramuskulärt.	

KRAMPANFALL

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Ge Stesolid om krampen varat i 3 minuter eller mer. Kontrollera B-glukos	Stesolid (rektallösning 10 mg/2,5ml)	En tub rektallösning (10 mg) ges rektalt	
2. Om patienten ej blir krampfri inom några minuter på denna behandling kontaktas läkare och perifer nål sätts			

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

MISSTÄNKT HÖFTFRAKTUR

	Läkemedel	Dosering	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
1. Kontakta läkare för bedömning, men om läkare ej nås kan behandling enligt generella direktiv nedan ges.			
2. Förflytta inte den person som fallit – bädda bekvämt och varmt. Tänk på risken för trycksår.			
3. Beställ ambulans (inte bårbil!)			
4. Ge Morfin vid smärta	Morfin (inj vätska 10 mg/ml)	0,25-0,5 ml subkutant eller intramuskulärt. Läkarkontakt tas om patient ej blir smärtlindrad av denna dos.	Vid kontakt med läkare, påtala om patienten står på kontinuerlig opioid-behandling sedan tidigare.
5. Sätt i.v. nål			
6. Sätt infusion	Ringer-Acetat (inf. vätska)	1000 ml	
7. Om syrgas finns ges detta	Syrgas	2 L/min på gramma	Om patienten har KOL, kontakta läkare för lämplig ordination.

Generella direktiv vid överkänslighetsreaktion är utarbetade i samarbete med Expertgrupp Allergi
 Generella direktiv vid akut hjärtsvikt/lungödem är utarbetade i samarbete med Expertgrupp Hjärta-Kärl
 Generella direktiv vid hypoglykemi är utarbetad i samarbete med Expertgrupp Diabetes
 Generella direktiv vid krampanfall är utarbetad i samarbete med Expertgrupp Neurologi
 Generella direktiv vid misstänkt höftfraktur är utarbetad i samarbete med Hamid Eskandarzadeh, MLA, Akutsjukvården

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Läkemedel som kan ges efter individuell bedömning av sjuksköterska vid enkla åkommor till vuxna, enligt generella direktiv

Uttag för behandling enligt nedanstående indikationer får ges under högst 3 dagar. Det ska journalföras med uppgift om bedömning, åtgärd och utvärdering och meddelas läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för information eller ställningstagande om fortsatt behandling.

Indikation	Läkemedel	Dosering	Max antal doseringstillfällen per dygn	Kontraindikationer/Att observera (se även FASS)
Feber Lätt-måttlig värk	Alvedon tabl 500 mg	1-2 tabl	4 gånger	Risk för leverskada om patient har sjukdom eller läkemedel som påverkar levern
	Alvedon supp 500 mg	1-2 supp	4 gånger	
Sura upp-stötningar, gastrit	Omeprazol Enterokaps 20mg	1 kaps	1 gång	
Förstoppning	Laxiriva , pulver Laxoberal , dr Microlax , klyσμα Dulcolax supp 10 mg Klyx , klyσμα 120 ml	1 dospåse 5-15 dr 1 klyσμα 1 supp 1 klyσμα		Ej vid oklara buksmärter
Kärlkramp (angina pectoris)	Nitrolingual spray 0,4 mg/dos	1-2 sprayningar vid anfall	Kan upprepas 1 gång efter 10-15 minuter om dålig effekt	Om känd angina och ingen effekt efter 2 omgångar, vid mer lättutlösta angina, mer frekvent angina eller om nydebuterad angina: Kontakta läkare
Sömnsvårigheter	Zopiklon tabl 5 mg	1 tabl	1 gång	Får ges högst 3 nätter utan läkares ordination och endast om det finns möjlighet till uppföljning av given dos.
Oro	Oxascand tabl 5 mg	1-2 tabl	1 gång	Enbart där möjlighet till upprepad uppföljning av given dos.
Näsblödning	Blodstillande vadd			

För receptfria läkemedel rekommenderar Läkemedelskommittén allmänt att "vid sjukdomsbehandling kortare tid än tre månader och när det finns lämpliga receptfria läkemedelsförpackningar eller när egentlig sjukdom inte föreligger ska recept inte skrivas med förmån." Av denna anledning finns många efterfrågade receptfria läkemedel inte med i Generella behandlingsanvisningar.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Läkemedel som SKA finnas i GBA-förråd

Preparat	Styrka	Förpackningsstorlek
Adrenalin, inj vätska	1 mg/ml	10 x 1 ml
Betapred, tabl	0,5 mg	30 st
Betapred, inj vätska	4 mg/ml	5 x 1 ml
Furix, inj vätska	10 mg/ml	5 x 4 ml
Glucagon, inj vätska	1 mg	1 st
Glukos, inj vätska	300 mg/ml	20 x 10 ml
Haldol, inj vätska	5 mg/ml	5 x 1 ml
Insulin lispro Sanofi, inj vätska	100 E/ml	5 x 3 ml
Loratadin, tabl	10 mg	30 st
Midazolam, inj vätska ♦	5 mg/ml	10 x 1 ml
Morfin, inj vätska ♦	10 mg/ml	10 x 1 ml
Nitrolingual, spray	0,4 mg/dos	200 doser
OxyNorm, inj vätska ♦	10 mg/ml	10 x 1 ml
Primperan, inj vätska	5 mg/ml	12 x 2 ml
Ringer-Acetat, inf vätska		10 x 1 000 ml
Robinul, inj vätska	0,2 mg/ml	10 x 1 ml
Stesolid, rektallösning ♦	10 mg/2,5 ml	5 x 2,5 ml

Observera att ovanstående läkemedel bara får användas efter läkares ordination eller i akuta situationer enligt rutin Läkemedel som kan ges i akuta situationer enligt generella direktiv, se sida 5-9.




Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd

Preparat	Styrka	Förpackningsstorlek
Alvedon, tabl	500 mg	100 st
Alvedon, supp	500 mg	50 st
Amoxicillin, tabl	500 mg	30 st
Atrovent inhalationsspray	20 µg/dos	200 doser
Bactrim Forte, tabl	800 mg/160 mg	50 st
Blodstillande vadd		5 st
Ciprofloxacin, tabl	500 mg	20 st
Clindamycin, kaps	300 mg	30 st
Cortimyk, kräm	20+10 mg/g	50 g
Dimor, kaps	2 mg	16 st
Doxyferm, tabl	100 mg	15 st
Dulcolax, supp	10 mg	50 st
Emovat, kräm	0,05%	30 g
Flucloxacillin, tabl	1 g	30 st
Fucithalmic, ögonsalva	1 %	5 g
Furix, tabl	20 mg	100 st
Heminevrin, kaps APL ❖	300 mg	25 st
Heminevrin, oral lösn ❖	50 mg/ml	300 ml
Innohep, inj. vätska	2500 IE	10x1 förfylld spruta
Innohep, inj. vätska	4500 IE	10x1 förfylld spruta
Klyx, klysma	1+250 mg/ml	10 x 120 ml
Kåvepenin, tabl	1 g	30 st
Laxiriva		50 st
Laxoberal, droppar	7,5 mg/ml	30 ml
Metoklopramid, tabl	10 mg	40 st
Metronidazol, tabl	500 mg	30 st
Microlax, klysma		12 x 5 ml
Morfin, tabl ❖	5 mg	30 st
Natriumklorid, inj vätska	9 mg/ml	20 x 20 ml
Nitrofurantoin, tabl	50 mg	15 st
Nystatin, oral suspension	100 000 IE/ml	100 ml
Oculac, ögondroppar	50 mg/ml	20 x 0,4 ml

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Läkemedel som KAN finnas i GBA-förråd (fortsättning)

Preparat	Styrka	Förpackningsstorlek
Omeprazol, enterokaps	20 mg	56 st
Ondansetron, inj vätska	2 mg/ml	5 x 2 ml
OptiChamber Diamond inhalationshjälpmedel		1 st
Mask från 5 år blå large		1 st
Oxascand, tabl 	5 mg	25 st
OxyNorm, kaps 	5 mg	14 st
Penomax, tabl	200 mg	30 st
Pevaryl, kräm	1 %	30 g
Rocephalin med lidokain inj flaska	1 g	1 st
Tamiflu, tabl	30 mg	10 st
Tamiflu, tabl	75 mg	10 st
Valaciclovir, tabl	500 mg	42 st
Ventoline Evohaler, inhalationsspray	0,1 mg/dos	200 doser
Väteperoxid	3 %	250 ml
Zopiklon, tabl 	5 mg	30 st

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Historik

Ersätter dokument Generella behandlingsanvisningar 2023

Utarbetat av

Expertgrupp Äldre och Läkemedel

Sara Norberg, Läkemedelscentrum, Storuman

Björn Sondell, Geriatriskt centrum, NUS

Kerstin Rakhola, MAS Umeå kommun (tillfälligt tjänstledig)

Liv Kämpe, MAS Dorotea kommun

Åse Ring, Citymottagningen, Umeå

Godkänt och fastställt av

Bo Sundqvist, Ordförande Läkemedelskommittén Region Västerbotten

Magnus Hedström, Områdeschef, Region Västerbotten

Referenser

Ej tillämpbar.

Bilaga 1: Inrättande av kommunalt GBA-förråd

Läkemedelscentrum, Region Västerbotten godkänner nya beställande enheter av läkemedel till kommunalt GBA-förråd efter ansökan från **kommunens Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska**. Blanketten fylls i och skickas av kommunens MAS till lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se.

Uppgifter om förrådet

(Uppgifter markerat med * är obligatoriska)

Kryssa för i vilken egenskap blanketten skickas in*		
<input type="checkbox"/> Nytt GBA-förråd <input type="checkbox"/> Borttag av GBA-förråd <input type="checkbox"/> Ändring av befintligt GBA-förråd		
Förrådets namn*		
Leveransadress*		
Postnummer och ort*		
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska*		
Telefon/Mobil*	Fax:	E-postadress*
Kommun*		

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.